



شماره: ۳۰۴/۱۴۴۵۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

پیوست: ندارد

تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین
مقام معظم رهبری

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: دستورالعمل توزیع و دسترسی به داروی اوسلتامیویر در برنامه مراقبت آنفلوانزا در سیستم

بهداشتی کشور-مهر ۱۴۰۱

با سلام و احترام

پیرو مکاتبات به شماره ۳۰۴/۶۳۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ و شماره ۴۰۰/۲۲۲۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ و شماره ۴۰۰/۲۲۴۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ و شماره ۳۰۴/۱۶۰۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ و شماره ۴۰۰/۲۲۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ مبنی بر نحوه توزیع و دسترسی به داروی اوسلتامیویر در سیستم بهداشتی و درمانی کشور در برنامه مراقبت آنفلوانزا، با عنایت به سوالات مکرر همکاران و هماهنگی عملیات اجرایی موارد زیر به استحضار می‌رسد:

اندیکاسیون های تجویز اوسلتامیویر:

- ۱- در کلیه مواردی که نیاز به مصرف داروی اوسلتامیویر می‌باشد توجه به تطبیق موارد بیماری با تعاریف استاندارد مراقبت آنفلوانزا و تعاریف علمی الزامی می‌باشد.
- ۲- زنان باردار مشکوک (در صورتی که تشخیص بالینی دیگری مطرح نباشد) یا قطعی مبتلا به آنفلوانزا
- ۳- کودکان زیر ۵ سال ترجیحا زیر ۲ سال مشکوک (در صورتی که تشخیص بالینی دیگری مطرح نباشد) یا قطعی مبتلا به آنفلوانزا (در صورت ضعف سیستم ایمنی از قبیل آسم، دیابت و ...)
- ۴- بیماران دارای بیماری زمینه‌ای یا مزمن مشکوک (در صورتی که تشخیص بالینی دیگری مطرح نباشد) یا قطعی مبتلا به آنفلوانزا
- ۵- بیماران مشکوک به بیماری تنفسی شدید حاد تنفسی بستری در بیمارستان (در صورتی که تشخیص بالینی دیگری مطرح نباشد) یا قطعی مبتلا به آنفلوانزا
- ۶- ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی درمانی به بیماران مبتلا به آنفلوانزا (در صورت ضعف سیستم ایمنی) که وسایل حفاظت فردی را بطور مناسب استفاده نکرده‌اند (حسب نظر فوکل علمی برنامه)
- ۷- افراد در معرض تماس با بیماران مبتلا به آنفلوانزای پرندگان یا کانون آنفلوانزای پرندگان در صورتی که اقدامات احتیاطی حفاظت فردی را بدرستی رعایت نکرده‌اند (حسب نظر فوکل علمی برنامه)

آدرس: شهرک قدس - بلوار فرحزادی - خیابان ایوانک - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - بلوک A - طبقه ۱۵
کد پستی: ۱۴۶۷۶۶۴۹۶۱ شماره: ۸۱۴۵۴۳۵۷ صفحه الکترونیکی معاونت بهداشت: <http://Health.behdasht.gov.ir>



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۱۴۴۵۷ د

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری

نحوه توزیع و دسترسی به داروی اوسلتامیویر در بخش بهداشت :

- ۱- توزیع در مرکز جامع خدمات سلامت منتخب ترجیحا شبانه روزی یا ۱۶ ساعته / داروخانه شبانه روزی منتخب ترجیحا مستقر در بیمارستان مرجع / ستاد مرکز بهداشت شهرستان : اطلاع رسانی در خصوص وجود داروی مذکور در مراکز تعیین شده الزامی می باشد.
- ۲- برنامه ریزی و هماهنگی لازم در زمینه توزیع برای درمان حداقل ۱۰ بیمار در کلیه بیمارستانهای تحت پوشش به عمل آید.
- ۳- تجویز توسط پزشکان متخصص عفونی/داخلی/اطفال/ اورژانس/پزشک عمومی مستقر در اورژانس، پزشکان عمومی دوره دیده و آشنا به برنامه های مراقبتی آنفلوانزا
- ۴- در موارد سرپایی که اندیکاسیون مصرف مطرح و دارو تجویز می گردد ، تجویز با هماهنگی و نظر فوکل پوینت علمی برنامه در دانشگاه/دانشکده/شهرستان /یا پزشک دوره دیده به عمل آید.
- ۵- توجه به رایگان بودن تجویز دارو در بخش بهداشت و تبادل داده های مصرف و بیماران با بخش بهداشت الزامی می باشد.

دکتر شهنار عرشی

سرپرست مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

آدرس: شهرک قدس - بلوار فرحزادی - خیابان ایوانک - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - بلوک A - طبقه ۱۵
کد پستی: ۱۴۶۷۶۶۴۹۶۱ شماره: ۸۱۴۵۴۲۵۷ صفحه الکترونیکی معاونت بهداشت: <http://Health.behdasht.gov.ir>

لیست مراکز درمانگر آنفلوآنزا البرز ۱۴۰۲

شهرستان	مراکز خدمات جامع سلامت	آدرس	تلفن
کرج	حضرت علی اصغر	باغستان غربی - بوستان ۱۳ - میدان ولیعصر - نبش بلوار شبنم	۳۴۳۰۴۸۰۰
کرج	ولدآباد بزرگ	ولدآباد بزرگ - بلوار بسیج - جنب پارک آزادگان	۳۶۳۰۴۲۲۲
کرج	شهدای آق تپه	مهرشهر - بلوار ارم - خیابان پنجم شرقی آق تپه	۳۴۳۰۴۸۰۰
کرج	شهدای کمالشهر	کمالشهر - خیابان شهید بهشتی - خیابان فجر ۱۲	۳۴۷۰۲۸۲۴
کرج	شهید گروسی	ماهدشت - میدان آزادگان - خیابان شهید بهشتی	۳۷۳۰۲۶۸۸
کرج	حضرت علی(ع)	خ چالوس - خ هاشمی نژاد - خ کافی - خ مهرانی - خ رسولی	۳۲۲۱۹۳۸۲
کرج	شهید ترکیان	رجایی شهر - فلکه اول - جنب آتشنشانی - خیابان یکم غربی	۳۴۴۱۳۵۸۷
کرج	شهید راست روش	خیابان شهید بهشتی - چهارصد دستگاه - روبروی استخر دانش	۳۲۷۰۰۰۱۱
کرج	شهید اسکندری	کلاک نو - خیابان شهید اسکندری	۳۲۳۰۴۴۳۶
کرج	شهید روستانزاد	میدان استاندارد - خیابان اصلی شیخ سعدی - خیابان شهید صمد بابایی	۳۲۷۵۲۱۳۱
کرج	گرمدره	گرمدره - خیابان ۱۲ متری شهدا	۳۶۱۰۳۷۳۷
کرج	سد امیر کبیر	کیلومتر ۱۸ جاده چالوس - روستای خوزنکلا	۳۵۳۴۲۲۲۲
کرج	سیرا	کیلومتر ۳۵ جاده چالوس	۳۵۲۴۰۱۹۸
کرج	نساء	کیلومتر ۶۴ جاده چالوس	۳۵۲۶۲۳۳۰
فردیس	شهدای فردیس	فردیس - کانال غربی - روبروی کتابخانه امینی - نبش خ امام رضا	۳۶۵۴۲۴۳۴
فردیس	ارم	فردیس - شهرک ارم ؛ بلوار مینا - بلوار ارم - لاله غربی - جنب پارک	۳۶۶۱۲۳۴۰
فردیس	شهدای مشکین دشت	مشکین دشت - خیابان هدایتکار - خیابان پاسگاه - پشت مخابرات	۳۶۲۰۳۰۳۰
ساوجبلاغ	کوهسار	کوهسار ، بلوار امام خمینی(ره) خ شهید عبدالمطلب افتخاری جنب شورا	۵-۴۴۳۷۸۸۴
ساوجبلاغ	گلسار	گلسارخ طالقانی کوچه زکریای رازی	۴۴۵۲۳۰۵۰
ساوجبلاغ	شهید طهرانی	شهر جدید فاز ۷ میدان ناجابلوار بعثت روبروی پارک سوار ساختمان خیریه طهرانی	۴۴۲۷۳۰۰۷
چهارباغ	ابن سینا	چهارباغ - بلوار امام خمینی - روبروی گلستان ۸	۴۴۵۶۲۸۴۵
نظرآباد	امام علی (ع)	نظرآباد - محله علی آباد - خ بهارستان ۵۱	۴۵۳۵۵۲۵۵
طالقان	شهید البرزی	طالقان - شهرک - روبروی اداره برق	۴۴۷۲۲۵۲۵
اشتهارد	شهید ملا حسینی	اشتهارد - بلوار آیت الله خامنه ای - جنب بانک ملی	۳۷۷۲۲۷۳۹

ساعات کار مراکز خدمات جامع سلامت : شنبه تا چهارشنبه ۱۴-۸ پنجشنبه ۱۳-۸



گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
شماره: ۱۴۰۲/ص/۴۰/۱۴۰۸
پیوست: دارد



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی البرز
معاونت بهداشتی

مهار تورم، رشد تولید (مقام معظم رهبری)

جناب آقای دکتر صداقت

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان کرج

جناب آقای دکتر حسینی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان فردیس

جناب آقای دکتر فرهاد سپنج

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان ساوجبلاغ

جناب آقای دکتر سید عباس طباطبائی

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان نظرآباد

با سلام و احترام

با عنایت به اهمیت دسترسی به داروی اوسلتامیویر در راستای برنامه مراقبت و کنترل بیماری آنفلوانزا، خواهشمند است دستور فرمایید بیماران سرپایی مشمول دریافت داروی اوسلتامیویر جهت پروفیلاکسی و درمان طبق دستورالعملهای مربوطه، همراه با نامه ارجاع پزشک مربوطه به مراکز منتخب درمانگر آنفلوانزا که لیست آن به پیوست ارسال می‌گردد، ارجاع گردند. دستورالعمل‌های فوق‌الذکر شامل مکاتبات شماره ۳۰۴/۱۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲، شماره ۳۰۴/۱۴۵۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ و ۳۰۴/۱۴۴۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در خصوص اندیکاسیون‌های تجویز اوسلتامیویر، دستورالعمل چگونگی تهیه سوسپانسیون اوسلتامیویر، دستورالعمل توزیع و دسترسی اوسلتامیویر در بخش بهداشت و راهنمای مراقبت و کنترل بیماری آنفلوانزا، به پیوست ارسال می‌گردد.

دکتر شهاب معینی مستوفی
رئیس مرکز بهداشت استان

روابط عمومی
اعلام شود

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

دفترخانه سازمان نظام پزشکی کرج
شماره: ۱۴۰۲/۳۳۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

نامه فوق بدون مهر معاونت فاقد اعتبار می‌باشد.
دفترخانه: سازمان نظام پزشکی کل کشور

آدرس: کرج - میدان آزادگان - ۴۵ متری کاج - جنب ساختمان نظام پزشکی - معاونت بهداشتی
تلفن: ۲۲۵۴۸۲۷۶، دورنگار: ۲۲۵۴۳۲۰۰، کد پستی: ۳۱۵۵۴۲۵۶۹
www.abzums.ac.ir - health@abzums.ac.ir



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۱۲۷۰۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
پوست ندارد

تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: لزوم رعایت اندیکاسیون های تجویز داروی ضد ویروسی اوسلتامیویر در بیماران مشکوک به

آنفلوانزا-مهر ۱۴۰۱

با سلام و احترام

پیرو نامه ۳۰۰/۲۰۶۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ و در راستای برنامه مراقبت بیماری آنفلوانزا در کشور و با توجه به فصل افزایش بروز بیماری و همچنین سوالات مکرر همکاران در سطوح محیطی، خواهشمند است موارد زیر به منظور مصرف بموقع و صحیح داروی ضد ویروسی اوسلتامیویر در بیماران با تشخیص آنفلوانزا مورد توجه قرار گرفته و هماهنگی های لازم در خصوص اطلاع رسانی آن از طریق معاونت محترم درمان دانشگاه نیز به منظور پیشگیری از تاخیر در شروع درمان بیماران مورد اقدام قرار گیرد:

۱- داروی مذکور می تواند هم بعنوان مکمل پروفیلاکسی و هم درمان موارد مبتلا به آنفلوانزا بکار گرفته شود.

۲- گروه های دارای اولویت مصرف داروی فوق الاشاره عبارتند از:

- a- بیماران قلبی یا ریوی شدید
- b- بیماران با نقص و یا کاهش ایمنی
- c- افراد با ریسک بالا که به هر دلیل واکسن آنفلوانزا را دریافت نکرده اند و هم اکنون دچار علائم بیماری می باشند و بروز بیماری در آنان با عوارض شدید همراه می باشد.
- d- افرادی که مراقبت از بیماران با ریسک بالا را برعهده دارند و واکسینه نشده اند و دچار علائم بیماری شده اند.

۳- مدت زمان استفاده از داروی اوسلتامیویر بعنوان پروفیلاکسی بمدت ۷-۱۰ روز (یک نوبت در روز) و بعنوان درمان بمدت ۵ روز (دو نوبت در روز) در افراد بزرگسال می باشد. مدت درمان بنا به تشخیص پزشک معالج می تواند بیشتر از مدت ذکر شده باشد. در کودکان بر اساس جداول دارویی و تعدیل دوز اقدام گردد.

۴- افراد در معرض تماس در کانون های آنفلوانزای پرندگان که واکسن آنفلوانزای سالیانه دریافت نکرده اند به منظور پیشگیری پروفیلاکسی حداقل بمدت ۱۰ روز تحت درمان پروفیلاکسی یا اوسلتامیویر قرار می گیرند.

a- افراد مشکوک به آنفلوانزای پرندگان بلافاصله باید تحت درمان با داروی فوق قرار گیرند.

آدرس: شهرک قدس - بلوار فرحزادی - خیابان ایوانک - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - بلوک A - طبقه ۱۵
کد پستی: ۱۴۶۷۶۶۴۹۶۱ شماره: ۸۱۴۵۲۳۵۷ صفحه الکترونیکی معاونت بهداشت: <http://Health.behdasht.gov.ir>

شماره: ۳۰۴/۱۲۷۰۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

پوست ندارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری

- ۵- پرسنل ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی در صورتی که اقدامات احتیاطی کنترل عفونت را بدرستی رعایت کرده اند ضروری می باشد بعد از آخرین تماس با فرد بیمار، بمدت ۷-۱۰ روز تحت پروفیلاکسی دارویی با اوسلتامیویر قرار گیرند.
- ۶- گروههای پرخطر در بیماری آنفلوآنزای پرندگان(افرادی که در تماس خانوادگی نزدیک و یا ساکنین یک خانه در تماس نزدیک با بیمار مشکوک یا تایید شده آنفلوآنزای پرندگان ، محیط و پرندگان آلوده به آنفلوآنزا می باشند)، بلافاصله در اولین فرصت باید داروی اوسلتامیویر را دریافت نمایند.
- ۷- گروههای با خطر متوسط و خطر کم در صورت نیاز و با نظر پزشک معالج ، درمان برای آنها شروع خواهد گردید(راهنمای کشوری مراقبت و کنترل بیماری آنفلوآنزا- از انتشارات وزارت متبوع)
- ۸- افراد در معرض خطر و یا در معرض تماس بیماری آنفلوآنزا در صورت بروز علائم باید بلافاصله با تشخیص پزشک معالج تحت درمان یا پروفیلاکسی دارویی با اوسلتامیویر قرار گیرند. این گروه شامل موارد زیر می باشد:

سالمندان، ساکنین آسایشگاهها و کارکنان آن، بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، بیماران مبتلا به بیماریهای مختل کننده سیستم تنفسی، خانم های باردار بالاحص در سه ماهه دوم و سوم بارداری، کودکان و نوجوانانی که تحت درمان طولانی مدت با ترکیبات سالیسیلات قرار دارند ، کارمندان مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی، نیروهای درمانی ارائه کننده خدمات درمانی در منزل.

دکتر شهنام عرشی
سرپرست مرکز مدیریت
بیماریهای واگیر

آدرس: شهرک قدس - بلوار فرحزادی - خیابان ابوانگ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - بلوک A - طبقه ۱۵
کد پستی: ۱۴۶۷۶۶۴۹۶۱ شماره: ۸۱۴۵۴۳۵۷ صفحه الکترونیکی معاونت بهداشت: <http://Health.behdasht.gov.ir>



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۱۲۵۷۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

پوست: ندارد

تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین
مقام معظم رهبری

معاون محترم بهداشتی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... دانشگاه/

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: دستورالعمل چگونگی تهیه سوسپانسیون از کپسول اوسلتامیویر - مهر ۱۴۰۱

با سلام و احترام

پیرو نامه ۳۰۴/۱۴۲۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ مبنی بر ارسال دستورالعمل چگونگی تهیه سوسپانسیون از کپسول اوسلتامیویر و با عنایت به سوالات مکرر همکاران در زمینه نحوه تهیه سوسپانسیون فوق در برنامه مراقبت آنفلوانزا که دستورالعمل آن طی سالهای قبل ارسال و در جلسات آموزشی و کارگاههای کشوری آموزش آن ارائه گردیده است، مجدداً به استحضار می‌رساند:

۱- بطور معمول داروی اوسلتامیویر جهت درمان بیماران مبتلا به آنفلوانزا به مدت ۵ روز و جهت پیشگیری بمدت حداقل ۷ روز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲- داروی اوسلتامیویر به حرارت حساس بوده و باید در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

۳- جهت کودکان از سوسپانسیون اوسلتامیویر استفاده می‌شود و در صورتی که سوسپانسیون در دسترس نباشد می‌توان به روش زیر از کپسول اوسلتامیویر آن را تهیه نمود:

- محتوی کپسول ۷۵ میلی گرمی اوسلتامیویر را در مقداری آب (۲۸-۷۵ سی سی) حل نموده و از آن استفاده شود. این محلول قابل نگهداری در یخچال بمدت ۲۴ ساعت می‌باشد. اگر در ۲۸ سی سی آب محلول تهیه شود هر سی سی آن معادل ۲ میلی گرم و اگر در ۷۵ سی سی آب حل شود هر سی سی معادل یک میلی گرم می‌باشد. ترجیحاً با عنایت به تلخ بودن محلول تهیه شده و امتناع کودکان از خوردن آن و همچنین حل شدن بهتر دارو در محلول قندی، توصیه می‌شود بجای آب از محلول دکستروز ۱۰ درصد به میزان توصیه شده استفاده شود.
- درجدول زیر میزان دوز توصیه شده داروی ضد ویروسی اوسلتامیویر جهت درمان و پیشگیری ارائه می‌گردد.

آدرس: شهرک قدس - بلوار فرحزادی - خیابان ایوانک - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - بلوک A - طبقه ۱۵
کد پستی: ۱۴۶۷۶۶۴۹۶۱ نمابر: ۸۱۴۵۴۳۵۷ صفحه الکترونیکی معاونت بهداشت: <http://Health.behdasht.gov.ir>

شماره: ۳۰۴/۱۲۵۷۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

پوست: ندارد

تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه پزشکان محترم رسانیده شود.

گروه سنی	درمان	پیشگیری
اوسلتامی ویر		
بزرگسالان	۷۵ میلی گرم (یک کپسول) دوبار در روز	۷۵ میلی گرم یکبار در روز
کودکان بالای یکسال	۱۵ کیلوگرم یا کمتر	۶۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی
	۱۵ تا ۲۳ کیلوگرم	۹۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی
	۲۴ تا ۴۰ کیلوگرم	۱۲۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی
	بیشتر از ۴۰ کیلوگرم	۱۵۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی
زیر ۳ ماه	۱۲ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی	پیشنهاد نمی شود
۳ ماه تا ۵ ماه	۲۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی	۲۰ میلی گرم روزانه
۶ ماه تا ۱۱ ماه	۲۵ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی	۲۵ میلی گرم روزانه

دکتر شهنام عرشه
سرپرست مرکز مدیریت
بیماریهای واگیر

آدرس: شهرک قدس - بلوار فرحزادی - خیابان ایوانک - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - بلوک A - طبقه ۱۵
کد پستی: ۱۴۶۷۶۶۴۹۶۱ شماره: ۸۱۴۵۲۳۵۷ صفحه الکترونیکی معاونت بهداشت: <http://Health.behdasht.gov.ir>