

بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی البرز
معاونت درمان

ورودی دفتر نظام پزشکی کرج
شماره ۱۹۰۷ / ۱۲۰۰
تاریخ ۲۰ / ۰۶ / ۱۴۰۰

تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها (مقام معظم رهبری)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
شماره: ۱۴۰۰/ص/۵۰/۳۷۷۱
پیوست: دارد

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کرج

ریاست محترم مجتمع / مرکز آموزشی درمانی دولتی ...

ریاست محترم بیمارستان ...

ریاست محترم بیمارستان تامین اجتماعی ...

مسئول فنی محترم درمانگاه های عمومی / خصوصی / شبانه روزی ...

کلیه مطب های خصوصی استان

کلیه مراکز درمان ناباروری

کلیه مراکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی

کلیه دفاتر کار مامایی

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۴۰۰/ص/۴۰/۱۹۹۸ تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، معاونت محترم بهداشت و ریاست مرکز بهداشت استان در "خصوص
واکسیناسیون کووید-۱۹ در مادران باردار تا ۴۲ روز پس از زایمان" مقتضی است دستور فرمائید کلیه مادران باردار گیرنده خدمت،
جهت تشکیل پرونده و هماهنگی انجام واکسیناسیون کووید-۱۹ (طبق دستورالعمل کشوری مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ شماره ۱۴۰۰/ص/۳۰/۸۶۷۰، ابلاغی
وزارت متبوع (به پیوست))، به نزدیک ترین پایگاه سلامت محل سکونت خویش ارجاع داده شود.

دکتر جواد مظفری
سرپرست معاونت درمان دانشگاه
خدمات بهداشتی درمانی
استان البرز
معاونت درمان

لحم

①
در رابط عمر



شماره: ۱۴۰۰/۸۸۸۸
تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۱۴
مقام مسئول: دکتر/سرکار
مقام مسئول: دکتر/سرکار

رئیس محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
موضوع: دستور عمل واکسیناسیون مادران باردار با واکسن سینوفارم - مرداد ماه ۱۴۰۰

با سلام و احترام

با عنایت به درخواست تجویز واکسن سینوفارم در بارداری توسط دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس (نام شماره ۳۰۲/۸۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶) و تأیید موضوع در ستین همایش کمیته کشوری علمی واکسیناسیون کرونا، نامه شماره ۳۰۴/۸۴۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ رئیس محترم مرکز مدیریت بیماری های واکنش شرایط تزریق واکسن سینوفارم در مادران باردار آن دانشگاه در بابت بیماری کووید ۱۹ با شرایط اعلام شده زیر قابل انجام است:

۱. واکسیناسیون مادران باردار واجد شرایط منوط به رضایت وی پس از مشاوره خواهد بود.

نکات لازم به ذکر در مشاوره واکسیناسیون (واکسن سینوفارم) در بارداری

- ✓ مادران باردار در خطر بالاتر ابتلا به بیماری نیستند، اما در صورت ابتلا اشکال شدید تر بیماری در مادران باردار نسبت به زنان غیر باردار در سن مشابه بیشتر خواهد بود.
- ✓ واکسن سینوفارم ویروس غیر فعال می باشد و بنا به توصیه سازمان جهانی بهداشت (با توجه به خطرات تهدید کننده سلامت مادر در صورت ابتلا به کووید-۱۹)، به مادران باردار قابل توصیه است.
- ✓ به دلیل حفظ ایمنی بیشتر تا حصول نتایج و مستندات کافی، ترجیحاً واکسیناسیون بعد از هفته ۱۲ بارداری صورت پذیرد.
- ✓ واکسیناسیون به معنای ایجاد ایمنی قطعی نیست و تقویم اقدامات پیشگیری از ابتلا به کووید برای مادر باردار و اعضای خانواده الزامی است.
- ✓ مادران باردار پس از واکسینه شدن در صورت بروز علائم احتمالی ابتلا به بیماری کووید-۱۹، بایستی با اطلاع رسانی به مراکز بهداشتی و درمانی یا کد ۴ سامانه ۴۰۳۰



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره پرونده: ۳۳۳۳۳۳۳۳
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
نام خانوادگی: ...
نام پدر: ...
آدرس: ...

(مادران باردار) جهت اخذ راهنمایی های لازم یا حتی تعیین محل مراجعه جوداس و مشخصات

اقدام نمایند.

۱. توصیه می شود واکسیناسیون بعد از هفته ۱۲ بارداری انجام شود.

۲. گروه سنی مادران باردار واجد شرایط واکسیناسیون:

✓ همه مادران باردار با سن ۲۵ سال و بالاتر

✓ مادران در همه گروه های سنی شاغل در بهداشت و درمان

✓ همه مادران باردار در شرایطی که همسران ایشان در بخش های کرونا و یا مراکز بهداشتی

مدیریت کرونا شاغل هستند.

۳. مادران در همه گروه های سنی شاغل در گروه های شغلی اولویت دریافت واکسن مطابق

دستور عمل های واکسیناسیون کشوری

۴. همه مادران باردار با تمامه توبه بندی ۲۵ و بالاتر

۵. همه مادران با بارداری های در طولی و چندلولی، بارداری با IVF

۶. همه مادران باردار با بیماری زمینه ای شامل بیماری دیابت، قلبی، فشار خون بالا، مصرف داروهای

ایمونوساپرسیو، بیماری مزمن کلیوی، آنتی سیکل سل، پیوند اعضا، سیروز کبدی و آسم

۷. به علت خطرات ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در سه ماهه سوم بارداری، ضمن تاکید بر شناسایی مادران

باردار واجد شرایط، واکسیناسیون مادران واجد شرایط با سن بارداری ۲۸ هفته و بیشتر در اولویت

خواهد بود.

۸. در صورت تزریق دوز اول واکسن قبل از بارداری و یا عدم اطلاع از بارداری در زمان واکسیناسیون،

توصیه می شود پس از مشاوره با مادر و بر اساس ترجیح وی (در رابطه با زمان واکسیناسیون)

تزریق دوز دوم با واکسن سینوفارم به فاصله ۲۸ روز از تزریق قبلی یا بعد از هفته دوازده بارداری،

منسوخ پذیرد.

۹. فاصله بین واکسن ویدوس کرونا با واکسن آنفلوآنزا با تمام در بارداری حتی الامکان ۱۴ روز باشد.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۱۳۹۹/۲۸
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
موضوع: اطلاع رسانی
مقام: نظام سلامت و صحت

۱۱. تیمور گویزادین D فاکتور یا واکنش در ویس کرونا ندارد و مسائل دستورعمل های ابتلائی سلامت مادران انجام شود.

۱۲. واکنش سبب مادران باردار شامل، تابع اولویت های شفقی در دستورعمل های واکنش سبب کشور خواهد بود.

۱۳. برای همه مادران باردار شامل در مراکز بهداشتی و درمانی، رعایت ضوابط حفظ امنیت شفقی مادران باردار (موضوع نامه دورکاری به شماره ۲۰۰/۲۱۸۰۸ مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹) بعد از واکنش سبب هم الزامی است و در صورت لزوم فعالیت ایشان توجه به نکات ذیل لازم است.

۱۴. در صورت الزام به فعالیت حضوری ایشان در مراکز بهداشتی و درمانی، تا ۲۸ هفته اول بارداری، محل فعالیت خارج از مراکز مدیریت سبب یا بستری بیماران کوید-۱۹ باشد.
۱۵. در صورت بارداری بعد از ۲۸ هفته اتخاذ تمهیداتی برای دورکاری ایشان لازم است.

۱۶. زمان واکنش سبب در موارد ابتلا یا شک به بیماری کوید در مادر باردار، تابع دستورعمل کشوری واکنش سبب خواهد بود.

نکته ۱: تاکید و آموزش های لازم در مورد، تداوم رعایت پروتکل های پیشگیری از ابتلا به کوید-۱۹ به مادران باردار پس از واکنش سبب الزامی است.

نکته ۲: در مادرانی که تحت درمان با داروهای ضد انعقادی هستند، تزریق واکنش می بایست به صورت عمیق در عضله دلتوئید انجام شود.

با عنایت به مطالب پیشگفته، لازم است در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی و جمع آوری اطلاعات مادران باردار واجد شرایط واکنش سبب در آن دانشگاه و اجرای فرایند واکنش سبب اقدام شود.

کمیته دانشگاهی واکنش سبب مادران باردار:

کمیته دانشگاهی واکنش سبب مادران متشکل از مدیر گروه زنان و زایمان، حداقل یک نفر پرستار و یک نفر گروه عفونی و مدیر گروه داخلی با ریاست معاون محترم بهداشت می باشد. (دعوت به حضور سایر تخصص ها)

آدرس: تهران - پلاک ۱۳۹ - خیابان لری - تهران - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - تهران
شماره تماس: ۰۲۱-۸۱۲۳۳۵۷ | وبسایت: www.doh.gov.ir



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره: ۱۸۲۷
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
پوسته
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقام اعلام رسمی

بر اساس شرایط مادران باردار به عهده معاون محترم بهداشت خراسان (همینا دانشگاه مای) که برای تشکیل کمیته متخصص پریناتالوژی تدارک می توانند یا دانشگاه سبز لطف خود همانک نمایند.

مهم ترین موارد نیازمند بررسی در کمیته دانشگاهی واکسیناسیون:

- ✓ مادران با شرایط خاص یا وخامت بیماری های زمینه ای
- ✓ مادران دارای بیماری های زمینه ای که در این دستور عمل ذکر نشده
- ✓ مادران متقاضی تزریق واکسن آسترانیکا

مطابق نامه ۳۰۰/۴۳۲۸-د مورخ ۱۲ خرداد ماه سال جاری با عنایت به شرایط واکسن آسترانیکا در صورت ترجیح به واکسیناسیون با آسترانیکا یا بستن مورد در کمیته دانشگاهی واکسن مادران باردار بررسی شود و بر اساس تصمیم کمیته و مادر اقدام شود بدین است در صورت عدم صدور مجوز استفاده از این واکسن توسط کمیته تزریق واکسن سینوفارم بر اساس نظر کمیته انجام می پذیرد.

موارد تزریق واکسن مادران باردار در سامانه پورتال سلامت مادران به آدرس www.health.gov.ir دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس اداره سلامت مادران ستون لیستها واکسیناسیون مادران باردار ثبت شود بررسی ثبت برای کارشناسان ستادی سلامت مادران حوزه بهداشت و کارشناس مسئول مامایی حوزه درمان کارشناسان مادران ستاد شهرستان و اما مسئول بیمارستانها فراهم شده است. (نام کاربری و رمز عبور همانند ثبت اطلاعات زایمان در بیمارستان و خارج بیمارستان سامانه ایمان می باشد)

بر صورت بروز مشکل یا نیاز به استعلام یا شماره تلفن ۰۲۱-۸۱۴۵۴۹۹۹ مرکز خاتم نادری یوز تماس گرفته شود

دکتر علیرضا ربیعی
معاون بهداشت