



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره: ۳۰۰/۲۱۳۷۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵
پیوست: ندارد

«جهش تولید با مشارکت مردم»
(مقام معظم رهبری)

معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی...

موضوع: ورود واکسن شش گانه به برنامه کشوری ایمن سازی

با سلام و احترام

به آگاهی می رساند متعاقب اضافه شدن واکسن پنوموکوک به برنامه ایمن سازی کودکان و همچنین آمادگی برای مراحل انتهایی ریشه کنی فلج اطفال، در آبان ۱۴۰۳ استفاده از واکسن شش گانه (هگزاوالان) در برنامه ایمن سازی کودکان در کمیته کشوری ایمن سازی مطرح گردید. نظر به مزایای این واکسن شامل کاهش دفعات تزریق و افزایش رضایتمندی خانواده ها و کارکنان، تقویت ایمنی علیه هر ۳ سروتایپ ویروس فلج اطفال، کاهش حجم زنجیره سرمایه مورد نیاز، کاهش مصرف سرنگ و پد الکلی و کاهش تولید زباله های عفونی، استفاده از این واکسن به تصویب کمیته کشوری ایمن سازی رسید.

در حال حاضر تعداد محدودی از واکسن مذکور وارد کشور شده و جهت تزریق به گروه های هدف در دانشگاههای سراسر کشور توزیع خواهد شد. پس از تامین مقدار کافی در ماه های آتی، این واکسن به تدریج جایگزین واکسن پنج گانه و IPV خواهد شد. لذا در شرایط فعلی، هر سه واکسن شش گانه، پنج گانه و IPV قابلیت مصرف با توجه به بندهای ذیل خواهند داشت.

لازم به ذکر است توضیحات مشروح در مورد واکسن شش گانه (هگزاوالان) در برنامه و راهنمای ایمن سازی، مصوب کمیته کشوری ایمن سازی ویرایش ۱۴۰۳ درج شده است.

نکات کاربردی تجویز

- واکسن شش گانه حاوی اجزای دیفتیری، کزاز، سیاه سرفه تمام سلولی، هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب، هپاتیت ب و تزریقی فلج اطفال (IPV) است.
 - حداقل و حداکثر سن تجویز واکسن شش گانه مانند واکسن پنج گانه است و در برنامه جاری کشوری به شیرخواران ۲، ۴ و ۶ ماهه تزریق می شود.
 - نحوه تزریق آن عضلانی عمیق و سمت چپ است.
 - موارد ممنوعیت و احتیاط واکسن شش گانه مانند واکسن پنج گانه است.
 - محل نگهداری واکسن شش گانه در طبقه میانی یخچال و در سبدهای جداگانه و برچسب گذاری شده است.
- از یخ زدگی آن باید اجتناب شود و قبل از استفاده باید ویال واکسن تکان داده شود.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره: ۳۰۰/۲۱۳۷۹ د

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

پیوست: ندارد

«جهش تولید با مشارکت مردم»

((مقام معظم رهبری))

- در صورت تزریق واکسن شش گانه در ۴ و ۶ ماهگی، نیازی به تجویز جداگانه واکسن تزریقی فلج اطفال نیست.
- در صورت تزریق واکسن پنج گانه در نوبت اول و یا دوم، نوبت بعدی واکسیناسیون بر حسب موجودی واکسن می تواند با واکسن شش گانه یا پنج گانه (همراه با IPV) انجام شود.
- در صورت تزریق واکسن شش گانه در نوبت اول و یا دوم، نوبت بعدی واکسیناسیون بر حسب موجودی واکسن می تواند با واکسن شش گانه یا پنج گانه (همراه با IPV) انجام شود.

نحوه ثبت در سامانه های الکترونیکی سطح اول

تزریق واکسن شش گانه در ۲ ماهگی به عنوان شش گانه ۱، در ۴ ماهگی به عنوان شش گانه ۲ و در ۶ ماهگی به عنوان شش گانه ۳ ثبت می شود. چنانچه کودکی نوبت اول و دوم را پنج گانه اول و پنج گانه دوم دریافت کرده و در نوبت بعدی شش گانه دریافت نماید، این نوبت به عنوان شش گانه ۳ ثبت می شود.

نحوه ثبت در دفترچه مراقبت کودک

همانگی های لازم جهت ویرایش دفترچه مراقبت کودک و درج واکسن شش گانه در حال انجام است. تا آن زمان در صورت تزریق واکسن شش گانه، در کارت واکسن فعلی با ذکر تاریخ توضیح داده شود.

دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشت