



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۲۲۰۵۲  
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷  
پیوست: دارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

## معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

### موضوع: دستورالعمل تزریق واکسن فخراوک

با سلام و احترام

با توجه به صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن فخراوک (FAKHRA VAC) تولید شرکت میلاد دارو نور توسط سازمان غذا و دارو، به پیوست بروشور واکسن مذکور ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن دریافت سهمیه از سردخانه مرکزی، نسبت به آموزش کلیه واکسیناتورها اقدام شود. نکات حائز اهمیت در مورد واکسن مذکور به شرح ذیل اعلام می شوند:

- واکسن فخراوک حاوی ویروس غیر فعال بوده و ویال آن در دو نوع تک دز و ۴ دز عرضه می شود.
- ویال واکسن باید در شرایط ۲-۸ درجه سانتی گراد نگهداری، از نور محافظت شده و از یخ زدگی آن خودداری شود.
- ویال باز شده تا ۶ ساعت در یخچال و تا یک ساعت در دمای اتاق قابل نگهداری است.
- واکسن فخراوک در گروه سنی بالای ۱۸ سال قابل تجویز است.
- تاکنون مطالعه ای روی زنان باردار و شیرده انجام نشده است.
- قبل از تزریق، ویال باید به آرامی تکان داده شود تا کاملاً یکنواخت شود.
- نحوه تجویز آن دو دز نیم میلی لیتری با فاصله حداقل ۲۱ روز به صورت عضلانی و داخل عضله دلتوئید است.



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۲۲۰۵۲  
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷  
پیوست: دارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

- عوارض شایع واکسن فخراوک شامل درد محل تزریق ، خستگی ، تهوع ، اسهال ، خارش ، بی حالی ، قرمزی ، تورم ، خارش و سفتی محل تزریق ، سرفه و تنگی نفس است.
- موارد منع مصرف واکسن فخراوک شامل حساسیت به واکسن و اجزای آن ، صرع کنترل نشده یا سایر بیماری های پیش رونده سیستم عصبی و سابقه سندرم گیلن باره است.

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به کلیه مراکز تحت پوشش آن معاونت محترم ابلاغ شود.

**دکتر محمد مهدی گویا**  
ریس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر