



سازمان بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی درانی ایران  
معاونت بهداشت  
مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر  
اداره مراقبت

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها



جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی

معاونت بهداشت

مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

اداره مراقبت

# لیست بیماری‌ها و سندرم‌های واگیر تحت مراقبت در جمهوری اسلامی ایران

SURVEILLANCE OF COMMUNICABLE DISEASES AND SYNDROMES IN I.R.A.N

در صورت مشاهده هر یک از بیماری‌های واگیر و یا سندرم‌های تحت مراقبت، به واحد بهداشتی تعیین شده

(مرکز بهداشت شهرستان / کارشناس کنترل عفونت بیمارستان) گزارش گردد.

## الف: لیست بیماری‌های عمده تحت مراقبت ROUTINE SURVEILLANCE

**گزارش آنی و بلافاصله (کمتر از ۶ ساعت):**  
هاری - آنفلوآنزای پرندگان - تولا رمی - طاعون - وبا - سیاه زخم تنفسی - بوتولیسم - زیکا - چیکونگونیا - ایبولا - تب‌های خونریزی دهنده - کرونا - تیفوئید مقاوم به درمان - هرگونه افزایش ناگهانی موارد بیماریها (طغیان یا اپیدمی)

**گزارش فوری (در کمتر از ۲۴ ساعت):**  
فلج شل حاد - تب و بثورات حاد جلدی ماکولوپاپولر - سل ریوی - سیاه سرفه - دیفتری - کزاز - سندرم سرخچه مادرزادی - مننژیت - مالاریا - اسهال خونی - تب‌دنگی - تب راجعه - تب زرد - جذام - سیاه زخم جلدی - کزاز بالغین - سیستوزومیازیس بستری در بیمارستان بدن‌بال واکسیناسیون

**گزارش هفتگی (معمول):**  
سایر انواع سل (بجز سل ریوی) - انواع هیپاتیت‌های ویروسی - تیفوئید - بروسلوز - لیشمانیوز جلدی (سالک) و لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) - شیکلوزیس - سفلیس - سوزاک - HIV/AIDS - کیست هیداتیک - توكسوپلاسموزیس - فاسیولیازیس - لپتوسپیروزیس - پدیکلوزیس و گال

## ب- لیست سندرم‌های واگیر تحت مراقبت (مشمول گزارش فوری) SYNDROMIC SURVEILLANCE

**۱- سندرم فلج شل حاد : ACUTE FLACCID PARALYSIS SYNDROME**  
**تعریف:** فلج شل ناگهانی یعنی عدم حرکت پا و یا دست بدون سابقه ترومای (ضربه) واضح جسمانی در سن زیر ۱۵ سال و یا در هر سنی به شرط مشکوک شدن پزشک به فلج اطفال  
**مهم ترین تشخیص افتراقی:** فلج اطفال - گیلن باره - مننژیت - آنسفالیت - میلیت عرضی - آرتریت - میوزیت - سینوویت - انواع مسمومیت - گزش حیوانات و حشرات سمی - عوارض واکسیناسیون

**۲- سندرم تب و خونریزی (بدون تروما): FEVER WITH HEMORRHAGIC MANIFESTATION SYNDROME**  
**تعریف:** تب بیش از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل دو علامت از علائم زیر (خونریزی ناشی از تروما نباشد):  
۱. خونریزی پوست به صورت کبودی (اکیموز)  
۲. خونریزی نقطه نقطه (پتشی) در پوست  
۳. خونریزی دستگاه تنفس فوقانی (خونریزی از لثه یا بینی)  
۴. خونریزی دستگاه تنفس تحتانی (خلط خونی)  
۵. خونریزی دستگاه گوارش (استفراغ و مدفوع خونی، مدفوع سیاه)  
۶. خونریزی دستگاه ادراری (ادرار خونی)  
۷. خونریزی دستگاه تناسلی (خونریزی غیرطبیعی زنانه)  
**مهم ترین تشخیص های افتراقی:** CCHF (تب خونریزی دهنده کریمه کنگو) - مننگوکوکسمی - تیفوئید - تب‌دنگی - تب زرد - ایبولا - چیکونگونیا - سرخک - مالاریای شدید - لپتوسپیروز - سپتی سمی

**۳- سندرم تب و راش (بثورات) حاد جلدی : FEVER AND ACUTE RASH SYNDROME**  
**تعریف:** تب بیش از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علائم زیر به صورت منتشر:  
۱. لکه‌های کوچک و همسطح غیر هم‌رنگ با پوست (ماکول) معمولاً به صورت منتشر  
۲. دانه‌های کوچک و برجسته غیر هم‌رنگ با پوست (پاپول) معمولاً به صورت منتشر  
**الف: تب و راش حاد ماکولوپاپولر** مهم ترین تشخیص های افتراقی: سرخک - سرخچه - مننگوکوکسمی - منونوکلئوز عفونی - CCHF - چیکونگونیا - تب‌دنگی - سفلیس - تیفوس - تیفوئید - راش دارویی - گزش حشرات  
**تعریف:** تب بالاتر از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علائم زیر:  
۱. دانه یا دانه‌های کوچک، برجسته و آبدار در پوست (وزیکول)  
۲. برجستگی‌های بزرگ پوستی حاوی مایع غیر چرکی (تاول) یا مایع چرکی (پوستول)  
۳. بثورات فاقد پوست (زخمهای بدون ضربه یا بریدگی)  
۴. حال عمومی بد  
**ب- تب و راش حاد غیر ماکولوپاپولر:** مهم ترین تشخیص های افتراقی: آبله - آبله مرغان - سیاه زخم - تولا رمی - لیشمانیوز جلدی (سالک) - گال

**۴- سندرم شبه آنفلوآنزا (ILI) INFLUENZA-LIKE ILLNESSES SYNDROME**  
**تعریف:** تب به همراه سرفه ای که در طی یک هفته اخیر رخ داده باشد.  
**مهم ترین تشخیص های افتراقی:** آنفلوآنزا - پاراآنفلوآنزا - سیاه سرفه - کرونا - سارس

**۵- سندرم عفونت شدید حاد تنفسی SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS/ILLNESS SYNDROME (SARI)**  
**تعریف:** بروز تب و سرفه در طول یک هفته اخیر به همراه حداقل یکی از علائم زیر:  
۱. در سیستم تنفسی (تاکی پنه «تنفس تند»، فرو رفتگی عضلات بین دنده ای در حین تنفس، تنفس صدادار، خلط خونی)  
۲. در سیستم قلبی عروقی (درد قفسه سینه، افت شدید فشار خون، اختلال ریتم)  
۳. در سیستم عصبی (کاهش سطح هوشیاری، تشنج)  
**مهم ترین تشخیص های افتراقی:** آنفلوآنزا - کرونا - سل - سیاه سرفه - دیفتری - سرخک - سیاه زخم - تولا رمی - طاعون

**۶- سندرم سرفه مزمن CHRONIC COUGH SYNDROME**  
**تعریف:** سرفه پایدار به مدت دو هفته یا بیشتر که معمولاً همراه با خلط می باشد.  
**مهم ترین تشخیص افتراقی:** سل

**۷- سندرم مسمومیت غذایی: FOOD INTOXICATION SYNDROME**  
**تعریف:** بروز علائم زیر شامل بند ۱ یا ۲:  
۱. تهوع و استفراغ بعد از مصرف مواد غذایی یا آشامیدنی  
۲. شکم درد (دل پیچه) بعد از مصرف مواد غذایی یا آشامیدنی  
**مهم ترین تشخیص های افتراقی:** مسمومیت با عوامل شیمیایی - مسمومیت با عوامل باکتریایی، ویروسی، قارچی، انگلی - مسمومیت با فلزات سنگین - مسمومیت با سموم - تب مالت - مسمومیت با الکل

**۸- سندرم اسهال حاد غیر خونی ACUTE DIARRHEA (NON-BLOODY) SYNDROME**  
**تعریف:** اسهال حاد (غیر خونی) یعنی دفع حداقل ۳ بار مدفوع شل در ۲۴ ساعت بعلاوه: تهوع و استفراغ یا / شکم درد (دل پیچه) مهم ترین تشخیص های افتراقی: اسهال‌های ناشی از عوامل میکروبی، ویروسی، پارازیتی - وبا - تب مالت - عوامل شیمیایی

**۹- سندرم اسهال خونی BLOODY DIARRHEA SYNDROME**  
**تعریف:** اسهال خونی (وجود خون روشن در مدفوع اسهالی) یا با بدون تهوع و استفراغ یا شکم درد (دل پیچه) مهم ترین تشخیص های افتراقی: شیکلوز - آمیبیاز - سالمونلوز - فلزات سنگین - سیاه زخم - انواع دیگر وبا

**۱۰- سندرم زردی حاد ACUTE JAUNDICE SYNDROME**  
**تعریف:** «زردی در سفیدی چشم» یا زردی زیر زبان یا زردی خط وسط شکم  
**مهم ترین تشخیص های افتراقی:** انواع هیپاتیت - مالاریای شدید - لپتوسپیروز - بورلیوز - تب زرد - فاسیولیازیس - مسمومیت‌های شیمیایی - مسمومیت های قارچی

**۱۱- سندرم تب و علائم نورولوژیک (علائم عصبی) FEVER AND NEUROLOGICAL SYMPTOMS SYNDROME**  
**تعریف:** بروز تب ناگهانی بالای ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علائم زیر:  
**علائم اصلی:** سفتی گردن (سختی حرکات گردن) - تشنج - کاهش هوشیاری - تحریک پذیری  
**علائم کمکی:** سردرد شدید - استفراغ  
**مهم ترین تشخیص های افتراقی:** انواع مننژیت - انواع آنسفالیت - آنفلوآنزا - آبله مرغان - هاری - مالاریای مغزی - سیاه زخم - طاعون - مسمومیت «با سرب، جیوه، ارگانوفسفره، حلال های صنعتی»

**۱۲- سندرم تب طول کشیده PROLONGED FEVER SYNDROME**  
**تعریف:** داشتن تب بیش از ۳ روز به همراه یکی از علائم سردرد خفیف، درد عضلات، کوفتگی بدن و حال عمومی بد.  
**مهم ترین تشخیص های افتراقی:** سل - مالاریا - بروسلوز - تیفوئید - بورلیوز - لپتوسپیروز - تب‌دنگی - لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) - تب کیو - انواع هیپاتیت - HIV/AIDS

## ۱۳- سندرم شوک عفونی SEPTIC SHOCK SYNDROME

**تعریف:** بیمار بدحال با شواهد یک عفونت موضعی یا سیستمیک (به عنوان مثال رویت ترشح چرکی) یا احتمال (استعداد) عفونت مثل نقص ایمنی، سوختگی، ... بعلاوه حداقل ۲ علامت از ۳ علامت حیاتی ذیل:  
۱. تاکی پنه (تنفس تندتر از حد نرمال)  
۲. تاکی کاردی (ضربان قلب بیشتر از حد نرمال)  
۳. داشتن درجه حرارت کمتر از ۳۶ درجه سانتی گراد (هایپوترمی) یا داشتن تب بالای ۳۸ درجه سانتیگراد (هایپر ترمی)  
**مهم ترین تشخیص های افتراقی:** مننگوکوکسمی - تیفوئید - بروسلوز - طاعون - آنفلوآنزا - کرونا - سارس - مالاریا - وبای خشک - تب‌های خونریزی دهنده - سیاه زخم  
**علائم کمکی:**  
۱. اختلال عملکرد ارگانهای دور از محل عفونت (بدلیل هیپوپرفیوژن و بروز ایسکمی)  
۲. افت فشار خون که با تجویز مقدار کافی مایعات مناسب مثل نرمال سالین، رینگر لاکتات قابل برگشت باشد.  
۳. ایسکمی پوست: پرشدگی خون مویرگی بیشتر از ۳ ثانیه یا رنگ پریدگی پوست (در کودکان) (پس از برداشتن فشار انگشت از روی پوست، برگشت رنگ به پوست به حالت اولیه، بیشتر از ۳ ثانیه طول بکشد).  
۴. اختلال عملکرد کلیه: (اولیگوری)  
۵. اختلال عملکرد مغز: بیقراری، خواب آلودگی، کما (تغییر سطح هوشیاری)  
۶. اختلال عملکرد ریه: تنگی نفس، کبودی مخاط ها و انتهاها  
۷. سردی انتهای اندامها (گاهی و در مراحل پیشرفته)

**۱۴- سندرم مرگ ناگهانی و غیرمنتظره (مرگ مشکوک) SUDDEN DEATH AND UNEXPECTED SYNDROME**  
**تعریف:** مرگی که فاصله بین شروع علائم و وقوع مرگ کمتر از ۲۴ ساعت باشد و علت بیماریهای داخلی، تروما، قتل و موارد مشابه نباشد و علایم پوستی از قبیل پتشی، پورپورا، اکیموز، خونریزی در فرد مشاهده می شود:  
۱. توقف نبض و تنفس بمدت بیش از ۱۰ دقیقه در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از شروع علائم بیماری  
۲. مرگ غیرمنتظره (مرگ ناگهانی) که با دلایلی مانند کهولت سن، بیماری مزمن و یا حوادث (تروماها) که مرگ را قابل توجیه می کنند، ارتباط نداشته باشد  
۳. فاصله بین شروع علائم و وقوع مرگ کمتر از ۲۴ ساعت  
**مهم ترین تشخیص های افتراقی:** آنسفالیت - مننژیت - عفونتهای شدید - وبا - طاعون - مسمومیت های شدید - مارگزیدگی - مصرف الکل و مواد مخدر

**۱۵- سندرم تب و تورم غدد لنفاوی FEVER AND LYMPHADENOPATHY SYNDROME**  
**تعریف:** بروز تب به همراه تورم حاد غدد لنفاوی / گردن / زیر بغل / کشاله ران : (تب بیشتر از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علایم زیر : بزرگی غدد لنفاوی / درد غدد لنفاوی / التهاب غدد لنفاوی)  
**مهم ترین تشخیص های افتراقی:** طاعون - تولا رمی

**۱۶- سندرم بیماری های آمیزی SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES SYNDROME**  
**تعریف:** وجود هر یک از علائم زیر:  
\* در نوزادان: ترشح چشمی \* در خانم ها: درد زیر شکم - ترشح واژینال  
\* در آقایان: تورم بیضه - ترشح مجرا \* زخم یا زگیل تناسلی - التهاب مقعد - تورم اینگوینال  
**مهمترین تشخیص های افتراقی:** سوزاک - سفلیس - زگیل تناسلی - شانکروئید

شماره تماس واحد بیماری ها  
۰۲۶-۴۴۲۲۴۹۹